



 **Skilarence[®]**

Dimethylfumarat

Das Skilarence[®] Standard-Dosierungsschema zur Abgabe an Ihre Patienten


 **almirall**
feel the science

almirallmed.de

Das Skilarence® Standard-Dosierungsschema



Eine langsame Dosissteigerung nach dem etablierten Dosierungsschema gilt als Standard für die Behandlung der Psoriasis vulgaris mit Fumarsäureestern¹. Es wird empfohlen, die Behandlung mit Skilarence® in der Wirkstärke 30 mg zu beginnen. Im Laufe der Therapie wird Ihr behandelnder Arzt die Dosis langsam steigern und sich dabei an dem u. a. Dosierungsschema orientieren. Ihr Arzt wird sowohl die Steigerung der Dosis wie auch die langfristig benötigte Dosis (die sogenannte Erhaltungsdosis) an Ihre individuellen Therapiebedürfnisse anpassen.¹

Skilarence® 30 mg				Skilarence® 120 mg					
Einnahmezeit	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5	Woche 6	Woche 7	Woche 8	Woche 9
morgens 									
mittags 									
abends 									
Tagesdosis	30 mg	60 mg	90 mg	120 mg	240 mg	360 mg	480 mg	600 mg	720 mg

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, achten Sie darauf, dass Sie die Tabletten mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 1 Glas, ca. 250ml) zusammen mit einer Mahlzeit oder unmittelbar danach einnehmen. Dieses kann dazu beitragen, Magen-Darm-Beschwerden vorzubeugen.² Die Einnahme zusammen mit Milchprodukten kann ebenfalls dazu beitragen, die Verträglichkeit zu verbessern.¹



Skilarence® liegt als Tabletten in zwei Wirkstärken vor:

● Skilarence® 30 mg sind weiße, runde Tabletten, die 30 mg des Wirkstoffs Dimethylfumarat enthalten.



● Skilarence® 120 mg sind blaue, runde Tabletten, die 120 mg des Wirkstoffs Dimethylfumarat enthalten.



Die Dosis von Skilarence® wird langsam gesteigert, normalerweise beginnend mit Skilarence® 30 mg 1 x abends.

Das umseitig abgebildete Schema ist eine allgemeine Empfehlung. Ihr behandelnder Arzt wird den Verlauf der Dosierung, soweit erforderlich, auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Sollten Magen-Darm-Beschwerden auftreten, kann Ihr Arzt prüfen, ob eine langsamere Steigerung der Dosis möglich ist.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Nebenwirkungen feststellen sollten.

1 Nast et al., S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris Update 2011. JDDG, 2011.

2 Fachinformation Skilarence® Stand Juni 2017.



Dimethylfumarat

- 1 Nast et al., S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris Update 2011. JDDG, 2011.
- 2 Fachinformation Skilarence® Stand Juni 2017.

Skilarence® 30 mg magensaftresistente Tabletten, Skilarence® 120mg magensaftresistente Tabletten. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: Wirkstoff: 1 Tablette **Skilarence® 30mg** enthält 30 mg Dimethylfumarat. 1 Tablette **Skilarence® 120 mg** enthält 120mg Dimethylfumarat. **Sonstige Bestandteile:** Kern: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat; Beschichtung: Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Talkum, Triethylcitrat, Titandioxid (E171), Simethicon, **Skilarence® 120 mg zusätzlich:** Indigocarmin (E132), Natriumhydroxid. **Anwendungsgebiete:** Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis vulgaris, die eine systemische Arzneimitteltherapie benötigen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, schwere Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörungen, Schwangerschaft und Stillzeit. **Warnhinweise:** Skilarence® enthält Lactose. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. **Nebenwirkungen: Sehr häufig:** Lymphopenie, Leukopenie, Flush-Symptomatik, Diarrhö, abdominale Distension, Bauchschmerzen, Übelkeit. **Häufig:** Eosinophilie, Leukozytose, verringerter Appetit, Kopfschmerzen, Parästhesie, Erbrechen, Dyspepsie, Obstipation, abdominale Missempfindung, Flatulenz, Erythem, brennendes Gefühl auf der Haut, Pruritus, Fatigue, Hitzegefühl, Asthenie, erhöhte Leberenzymwerte. **Gelegentlich:** Schwindel, Proteinurie, erhöhte Serumkreatininwerte. **Selten:** allergische Hautreaktion. **Sehr selten:** akute lymphatische Leukämie, irreversible Panzytopenie. **Nicht bekannt:** progressive multifokale Leukenzephalopathie, Nierenversagen, Fanconi-Syndrom. **Stand der Information:** Juni 2017

Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spanien; **Örtlicher Vertreter: Almirall Hermal GmbH**, Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek, Deutschland, www.almirall.de

Das Dimethylfumarat für die Psoriasis-Therapie

Packungsgröße		PZN
Skilarence® 30mg	42 Tabl.	02253308
Skilarence® 120mg	90 Tabl.	05025789
Skilarence® 120mg	180 Tabl.	05025766



 **Skilarence®**

Dimethylfumarat

 **almirall**
feel the science

almirallmed.de