

# Wynzora® – die erste wasserhaltige Creme als CAL/BDP-Formulierung

Cremes sind mehrphasige Gemische aus wässriger, ölig und emulgierender Phase.


- Entsprechend der äußeren, kontinuierlichen Phase **zählt Wynzora® zu den hydrophilen Cremes (vom O/W-Typ)**, also mit einer wässrigen äußeren Phase.<sup>1,2</sup>

- Hydrophile Cremes wirken auf der Haut **befeuchtend** aber auch **fettend**.<sup>2</sup>

- O/W-Cremes hinterlassen auf der Haut **keinen Fettglanz** und können **gut aufgetragen** und **verteilt** werden.<sup>3</sup>

	Wassergehalt	
<b>WYNZORA® O/W-Creme</b>	ca. 20 %	fettreich
<b>CAL/BDP Gel/Salbe/Schaum</b>	0 %	ölig/fettig

## Modell der Wirkstoffpenetration in die Haut



- Wird die Creme in die Haut eingerieben, brechen die Öl-Tröpfchen auf und setzen die Wirkstoffe auf der Haut frei.
- Die **vollständig gelösten Wirkstoffe** dringen in die Haut ein und entfalten dort ihre Wirksamkeit.
- Öl und Wasser sorgen für Hautfeuchtigkeit.
- **Schnell einziehend**, ohne klebriges Hautgefühl<sup>4</sup>

Wynzora® –  
die Creme, die in  
den Alltag passt



8:00



8:05



8:10



8:15

© Almirall 2023 DE-WYN-2300029 09\_23



Wynzora®  
calcipotriol/betamethason creme

## TOPIISCHE PSORIASIS-THERAPIE\* CLEVER FORMULIERT

- Schnell einziehende, wasserhaltige Creme
- Gute Wirksamkeit<sup>5,6</sup> und schneller Wirkeintritt<sup>7</sup>
- Verbesserte Lebensqualität<sup>8</sup>

\*Leichte bis mittelschwere Psoriasis vulgaris bei Erwachsenen (einschließlich Psoriasis der Kopfhaut).

1. Praestegaard, M., F. Steele, and N. Crutchley. "Polyaphron Dispersion Technology, a Novel Topical Formulation and Delivery System Combining Drug Penetration, Local Tolerability and Convenience of Application." *Dermatol Ther (Heidelb)* (Sep 1 2022). <https://dx.doi.org/10.1007/s13555-022-00794-y>. 2. Daniels, R., and U. Knie. "Galenik Der Dermatika – Grundlagen, Eigenschaften, Freisetzung." *J Dtsch Dermatol Ges* 5, no. 5 (May 2007): 367-83. <https://dx.doi.org/10.1111/1610-0387.2007.06321.x>. 3. Dermatologische Externa-therapie: Unter besonderer Berücksichtigung der Magistralrezeptur; M. Gloor, K. Thoma, J. Fluhr 4. Stein Gold L, et al. A phase 3, randomized trial demonstrating the improved efficacy and patient acceptability of fixed dose calcipotriene and betamethasone dipropionate cream. *J Drugs Dermatol*.2021;20(4): doi:10.36849/DD.5653. Daten zur Kopfhaut wurden nicht erhoben. 5. Siehe Beschreibung der sekundären Endpunkte (mPASI; mPASI75) aus der prüfärzerverblindeten klinischen Studie von Stein Gold L, et al. A phase 3, randomized trial demonstrating the improved efficacy and patient acceptability of fixed dose calcipotriene and betamethasone dipropionate cream. *J Drugs Dermatol*. 2021;20(4): doi:10.36849/DD.5653. in der Wynzora® Fachinformation. 6. Siehe Beschreibung der sekundären Endpunkte aus der prüfärzerverblindeten klinischen Studie von Pinter A, Green LJ, Selmer J, et al. A pooled analysis of randomized, controlled, phase 3 trials investigating the efficacy and safety of a novel, fixed dose calcipotriene and betamethasone dipropionate cream for the topical treatment of plaque psoriasis. *J Eur Acad Dermatol Venerol*. 2021 Oct 10; doi:10.1111/jdv.17734. Online ahead of print, in der Wynzora® Fachinformation. 7. In der prüfärzerverblindeten Studie von Stein Gold L, et al. wurde als sekundärer Endpunkt eine statistisch signifikante Veränderung beim mPASI Wert (= prozentuale Veränderung von modifiziertem (ohne Kopf) Psoriasis Bereich und Schweregradindex) gegenüber Vehikel ab Woche 1 und danach beobachtet; vgl. Wiedergabe der Ergebnisse in der Wynzora® Fachinformation. 8. Siehe Beschreibung der weiteren explorativen Endpunkte DLQI aus 2 prüfärzerverblindeten klinischen Studien in der gepoolten Analyse von Pinter A, Green LJ, Selmer J, et al. A pooled analysis of randomized, controlled, phase 3 trials investigating the efficacy and safety of a novel, fixed dose calcipotriene and betamethasone dipropionate cream for the topical treatment of plaque psoriasis. *J Eur Acad Dermatol Venerol*. 2021 Oct 10; "The mean DLQI improvement from baseline, at Week 8, was significantly greater for CAL/BDP PAD-cream (6.5 points) compared to CAL/BDP TS (5.6 points, p < 0.0001) and vehicle (2.5 points, p < 0.0001)." Bei dem weiteren explorativen Endpunkt handelt es sich weder um einen primären noch um einen sekundären Endpunkt. Daten zur Psoriasis der Kopfhaut wurden in der gepoolten Analyse nicht berücksichtigt.

**Wynzora® 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Creme. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: Wirkstoff:** 1 g Creme enthält 50 Mikrogramm Calcipotriol und Betamethasondipropionat entsprechend 0,5 mg Betamethason. **Sonstige Bestandteile:** Isopropylmyristat (Ph.Eur.), dickflüssiges Paraffin, mittelkettige Triglyceride, 2-Propanol (Ph.Eur.), Macroglycolaurylether (Ph.Eur.) (4), Poloxamer (407), Macroglycolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), Carboran (45.000-65.000 mPa\*s), Butylhydroxyanisol (Ph.Eur.), Trolamin, Dinatriumhydrogenphosphat 7 H<sub>2</sub>O, Natriumdihydrogenphosphat 1 H<sub>2</sub>O, *all-rac-a*-Tocopherol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur topischen Behandlung einer leichten bis mittelschweren Psoriasis vulgaris (einschließlich Psoriasis der Kopfhaut) bei Erwachsenen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; kontraindiziert bei erythrodermischer, exfoliativer und pustulöser Psoriasis, bei Patienten mit bekannten Störungen des Kalziumstoffwechsels, bei viralen Läsionen (z. B. mit Herpes- oder Varizellen) der Haut, Pilz- oder bakteriellen Hautinfektionen, parasitären Infektionen, Hautmanifestationen von Tuberkulose, perioraler Dermatitis, atrophischer Haut, Striae atrophicae, Fragilität der Hautvenen, Ichthyose, Acne vulgaris, Acne rosacea, Rosacea, Ulzerationen und Wunden. **Warnhinweis:** Butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) oder Reizungen der Augen und Schleimhäute hervorrufen. Macroglycolglycerolhydroxystearat kann Hautreizungen hervorrufen. **Nebenwirkungen:** Verschwommenes Sehen. **Zusätzlich für Calcipotriol:** **Sehr selten:** Angioödem, Gesichtsoedem, Hyperkalzämie, Hyperkalziurie; **Nicht bekannt:** Brennen und Stechen, trockene Haut, Erythem, Hautausschlag, Dermatitis, verstärkte Psoriasis, Lichtempfindlichkeit und Überempfindlichkeitsreaktionen; **Zusätzlich für Betamethason:** **Selten:** Nebennierenrindensuppression Katarakt, Infektionen, Anstieg Augeninnendruck, Auswirk. auf Stoffwechselkontr. bei Diabetes mellitus; **Nicht bekannt:** Hautatrophie, Striae, Hypertrichose, periorale Dermatitis, allergische Kontaktdermatitis, Depigmentierung und Kolloidmiliun; Risiko einer generalisierten Psoriasis pustulosa; **Stand der Information: Oktober 2021**

Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spanien; Mitvertrieb: Almirall Hermal GmbH, Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek, Deutschland, [www.almirall.de](http://www.almirall.de)

Wynzora® ist in den Packungsgrößen 60 g (PZN 14036160) und 2 × 60 g (PZN 14036183) verfügbar.

 **almirall**  
feel the science

almirallmed.de